

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ • Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. • Να φοράτε κατάλληλα γάντια.

Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δειξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητείστε ιατρική συμβουλή εάν ο ερεθισμός επιμένει. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια για 15 τουλάχιστον λεπτά με άφθονο νερό. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή ή δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Σε περίπτωση εισπνοής: Διατηρήστε τον ασθενή ήρεμο. Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.

Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.

Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.

Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 2 ημέρες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνετα τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Τα κενά συσκευασίας να μην χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο σκοτεινό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:



YPSILON

Πρινς

PRINCE 10EC

Εντομοκτόνο

Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

Alphacypermethrin - Άλφα Συπερμεθρίνη 10%

Εγγυημένη σύνθεση: Alphacypermethrin: 10 % β/ο
Βοηθ. Ουσίες: 88,3 % β/β

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

**Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου
για την καταπολέμηση μασητικών
και μυζητικών εντόμων.**

- Εύφλεκτο
- Επιβλαβές όταν εισπνέεται
- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
- Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας κατά την παρατεταμένη έκθεσης σε περίπτωση κατάποσης.
- Επιβλαβές, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνευμονες σε περίπτωση κατάποσης.
- Επανειλημμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει εφρήση ή σκόσιμο δέρματος.
- Μπορεί να προκαλέσει παραισθησία.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες**

Κάτοχος της Έγκρισης-Παρασκευαστής
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:

Αριθμός
εγκρ. κυκλ.:
1769/4.12.1998



YPSILON

ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.

Δ, Γληνού 32, Βούλαγρη, Θεσσαλονίκη, 542 49

Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378

e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com | www.ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο 400 κ.εκ.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΗΛΟΣΙΔΗ: (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσουλιά): Καρποκάφα (Cydia pomonella), Αφίδες (Aphis pomi), Ψύλλα αχλαδιάς (Psylla pyri): 15 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (15-30 κ.εκ./στρέμμα). Με την εμφάνιση των προσβολών. Για την καταπολέμηση της ψύλλας εφαρμόζεται κατά την ανόιξη που ο πληθυσμός είναι ακόμη χαμηλός και δεν υπάρχει υπέρθεση γενεών και κατά το φθινόπωρο με την έναρξη της πτώσης των φύλλων εναντίον των ακμιάων που πρόκειται να διαχειμάσουν.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ: Πράσινη Αφίδα (Myzus persicae): 15 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (22,5-37,5 κ.εκ./στρέμμα). Με την εμφάνιση των προσβολών.

ΑΜΠΕΛΙ: Ευδεμίδα (Lobesia botrana): 10-15 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (5-23 κ.εκ./στρέμμα). Με την εμφάνιση των προσβολών.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Τομάτα υπαίθρου - Θερμοκηπίου: Αλευρώδης (Trialeurodes spp.): 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (υπαίθρου: 15-30 κ.εκ./στρέμμα, Θερμοκηπίου: 15-60 κ.εκ./στρέμμα). Με την εμφάνιση των προσβολών. Προνύμφες λεπιδοπτερον (Sporoptera εχιάμα): 15 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (υπαίθρου: 7,5-15 κ.εκ./στρέμμα, Θερμοκηπίου: 7,5-30 κ.εκ./στρέμμα). Με την εμφάνιση των προσβολών. Λάχανο: Φυλλοφάγες κάμπιες (Plenits brassicae, Mamestra brassicae) 15 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (15 κ.εκ./στρέμμα). Με την εμφάνιση των προσβολών.

ΒΑΜΒΑΚΙ: Πράσινο ακουλίκι (Heliothis armigera), Αφίδες (Aphis spp.), Θρίπας (Thrips spp.), Ρόδινο ακουλίκι (Pectinophora gossypiella): 30-40 κ.εκ./στρέμμα. Με την εμφάνιση των προσβολών.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ: Πυραλιδα (Ostrinia nubilalis): 17,5-35 κ.εκ./στρέμμα (35 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Με την εμφάνιση των προσβολών.

ΠΑΤΑΤΑ: Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata): 5-15 κ.εκ./στρέμμα (10-15 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Με την εμφάνιση των προσβολών.

ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ: Αφίδες (Aphis spp.), Προνύμφες λεπιδοπτερον (Sporoptera εχιάμα): 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (15-30 κ.εκ./στρέμμα). Με την εμφάνιση των προσβολών.
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Μηλοσιδή 2, Ροδακινιά 1, Αμπέλι 1, Λαχανικά (Τομάτα υπαίθρου-Θερμοκηπίου) 3, Λάχανο 3, Βαμβάκι 4, Καλαμπόκι 2, Πατάτα 2.

ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ/ΣΤΡΕΜΜΑ: Μηλοσιδή: 100-200 λίτρα, Ροδακινιά: 150-250 λίτρα, Αμπέλι: 50-150 λίτρα, Τομάτα: Υπαίθρου: 50-100 λίτρα, Θερμοκηπίου: 50-200 λίτρα, Λάχανο: 100 λίτρα, Βαμβάκι: 50-80 λίτρα. Καλαμπόκι, Πατάτα, Καλωπιστικά: 50-100 λίτρα.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός πλήρους καλύψεως.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε μέσα στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσουλιά, Ροδακινιά, Τομάτα (υπαίθρου, Θερμοκηπίου), Βαμβάκι, Καλαμπόκι: 7 ημέρες. Πατάτα, Αμπέλι, Λάχανο: 14 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνηθισμένες δόσεις και καλλιέργειες.