

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα και ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό. • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. • Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να έναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων. • Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

**Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.**

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον ασθενή σε καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέει, να γίνει τεχνητή αναπνοή. Σε περίπτωση κατάποσης να χορηγηθούν 1-2 ποτήρια νερό και να προκληθεί εμετός, μόνο εάν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του, με ερεθισμό του φάρυγγα. Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Να αποφεύγεται η χορήγηση βαρβιτουρικών, βενζοδιαζεπινών και βαλπροϊκού οξέος.

**ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΩΝ: 210/7793777**

#### Πολύ Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Μην μολύνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

#### Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.

Μην ψεκάσετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.

Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον.

Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:** Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:**



**ΥΨΙΛΟΝ®**

Αιμαπακέ

# ΑΒΑΜΕC 1,8 EC

Εντομοκτόνο

Υγρό Γαλακτωματοποίησης (EC)

Εγγυημένη Σύνθεση : Abamectin: 1,8 % β/ο  
Βοηθ. ουσίες: 98,1% β/β

**Εντομοκτόνο - Ακαρεοκτόνο  
στομάχου και επαφής.**

Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατο τους από αστία.

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



Επικίνδυνο για το περιβάλλον

- Επιβλαβές όταν εισπνέεται
- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
- Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα
- Ερεθίζει το δέρμα

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ  
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ  
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥΣ**

Αριθ. Εγκρ. Κυκλ: 14117 / 7-2-2006

Κάτοχος της Έγκρισης/Υπευθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:  
GAT Microencapsulation AG, Αυστρία.

Διανομέας:

**ΥΨΙΛΟΝ®**

ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.  
Δ. Γληνού 32, Βούλαρα, Θεσσαλονίκη, 542 49  
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378  
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com  
www.ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο **1** λίτρο

#### ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ

**Αχλαδιά:** Ψύλλα (Psylla pyricola) **75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού + 250 κ.εκ. παραφινικού λαδιού (θερινός πολτός).** Με την εμφάνιση 8-12 προνυμφών ανά ετήσιο βλαστό μήκους 20 εκατ.

**Τομάτα υπαίθρου:** Τετράνυχος (Tetra-nychus spp) **60-80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Με την εμφάνιση 5-10 κινητών μορφών ανά φύλλο.

**Λιριόμυζα (Liriomyza spp) 75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

**Τομάτα θερμοκηπίου:** Τετράνυχος (Tetra-nychus spp) **60-80 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Με την εμφάνιση 5-10 κινητών μορφών ανά φύλλο.

**Λιριόμυζα (Liriomyza spp.) 75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

**Τριανταφυλλιά:** Τετράνυχος (Tetra-nychus urticae, Tetranychus cinnabae-rinus) **40-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Με την εμφάνιση των ακάρεων.

**Ντάλια:** Τετράνυχος (Tetranychus spp) **40-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Με την εμφάνιση των ακάρεων.

**Λιριόμυζα (Liriomyza spp) 75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

**Ζέρμπερες:** Λιριόμυζα (Liriomyza spp) **75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται όταν υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί.

Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα:

- Αχλαδιά: 100-150 λίτρα
- Τομάτα (υπαίθρου): 50-100 λίτρα
- Τομάτα (θερμοκηπίου): 50-200 λίτρα
- Καλλωπιστικά: 50-80 λίτρα.

**Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα επεμβάσεων:** 2/7 για όλες τις καλλιέργειες.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός φυλλώματος.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα νερού και προσθέτουμε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος και λαδιού (όπου συνιστάται) αναδεύοντας.

Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας.

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. Στην αχλαδιά, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται ο συνδυασμός ΑΒΑΜΕC 1,8EC + λάδι 14 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του μυκητοκτόνου CAPTAN.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Να μην χρησιμοποιείται με σκευάσματα διαβρεκτικών και άλλων προσκολλητικών.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Αχλαδιά: **10** ημέρες.

Τομάτα υπαίθρου: **3** ημέρες

Τομάτα θερμοκηπίου: **7** ημέρες