

Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία: • Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν υπάρχουν συμπτώματα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν λερωθεί και πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν υπάρχουν συμπτώματα δηλητηρίασης. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Μην ψεκάσετε ανθισμένα φυτά.
Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.
Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα.
Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.
Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτία δεδομένων ασφαλείας.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέχρι τη μέση σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **ΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΣΚΟΠΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ.**

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής. Στα καλλωπιστικά, πριν τη γενικευμένη χρήση, να προηγηθεί δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή έκταση.

Συνδυαστικότητα: Το σκεύασμα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο του και να μην συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 2 ημέρες

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρείται στην αρχική του, καλά κλεισμένη συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από το ηλιακό φως. Δεν πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 0 °C ή μεγαλύτερες από 50 °C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:




ΥΨΙΛΟΝ®

Πλούτο

PLUTO

Εντομοκτόνο 1,86 EC

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: pyrethrins 1,86% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 97,08% β/β

Εντομοκτόνο επαφής της ομάδας των φυσικών πυρεθρινών. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, προκαλώντας αρχικά κατάρρευση και στη συνέχεια το θάνατό τους.

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥΣ**

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 14274 / 17-06-08

Τυποποιητής-Συσκευαστής: **GAT Microencapsulation AG**
Gewerbezone 1
2490 Ebenfurth AUSTRIA

Παρασκευαστής - Διανομέας: **ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.**


ΥΨΙΛΟΝ®

ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
Δ. Γλυνού 32, Βούλαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49
Tηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com
www.ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις			Χρόνος εφαρμογής	Μην σπασίστε, καλύψτε, μεσοστάμια περιόχων
		κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα φεκ. υγρού (l)	Όγκος φεκ. υγρού (λίτρα / στρέμμα)	κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: -Γκρέιπ φρουτ -Λεμονιά -Μανταρινιά -Πορτοκαλιά	Αφίδες (Aphis gossypii)	140-160	150-200	210-320		3/7
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: -Δαμασκηνιά -Κερασιά -Βερικοκιά -Ροδάκινιά -Κορομηλιά	Αφίδες (Myzus persicae)	140-160	150-200	210-320		3/7
Αμπέλι	Ευδεμίδα (Lobesia botrana) Τζιτζικιά (Empoasca vitis)	140-160	50-150	70-240		3/7
Τομάτο (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Αλευρώδεις (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)	160	50-120	80-192	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	3/7
Μελιτζάνα (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Δορυφόρος της πατάτας (Leptinotarsa decemlineata)	160-200	50-100	80-200		2/7
Πατάτα	Δορυφόρος της πατάτας (Leptinotarsa decemlineata)	160-200	50-100	80-200		2/7
Καλλωπιστικά	Θρίπες (Thrips tabaci) Αφίδες Αλευρώδεις (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)	140-160	50-100	70-160		2/7
Ελιά	Δάκος (Bactocera oleae) Πυρηνωτρίτης (Prays oleae)	125	150-200	187,5-250	Ανάλογα με τις συλλήψεις ενήλικων στις παγίδες Με την εμφάνιση της καρπόβιας γενιάς.	3

Παρατηρήσεις:

1. Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων.
2. Οι ψεκασμοί να διενεργούνται αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί και να γίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται καλή κάλυψη του εναερίου τμήματος της καλλιέργειας.