

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Στα εσπεριδοειδή σε προγράμματα "ολοκληρωμένης αντιμετώπισης" συνιστάται να εφαρμόζεται, όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός ακμιάων του παρασίτου *Cales noacki* ωρίμων για ωσποκία.

2. Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής (μικτός πληθυσμός, παρουσία μελιτωμάτων) ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται 20-30 ημέρες από τον προηγούμενο.

3. Στα εσπεριδοειδή για την καταπολέμηση του Φυλλοκνίστη (*Phyllocnistis citrella*) η μικρή δόση συνιστάται για μικρή πίεση προσβολής ενώ η μεγάλη δόση για μεγάλη πίεση προσβολής.

4. Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής εριώδη αλευρώδη (μικτός πληθυσμός) συνιστάται η προσθήκη (TANK-MIX) θειονικού λαδιού σε δόση 1 λίτρο.

5. Στις περιπτώσεις εφαρμογής με ριζοπότημα, το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την πυκνότητα των φυτών.

6. Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας.

7. Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνθησης.

8. Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίτωμα (π.χ. περισσότερο από 4 αφίδες ανά φύλλο)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος ή ριζοπότηματα

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Δεν χρειάζεται προδιάλυση. Ρίχνουμε το σκεύασμα κατ' ευθείαν στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά και προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες, δόσεις και για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Να φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά • Μακριά από τροφή ποτά και ζωοτροφές • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Μην αναπνέετε ατμούς / εκνεφώματα. • Αποφεύγετε επαφή με τα μάτια και το δέρμα. • Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος • Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας. **Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. **Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Συμπτωματική θεραπεία. **Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777**

ΒΛΑΒΕΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ.

Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονιάσας μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Εσπεριδοειδή: 21 ημέρες, Αχλαδιά: 7 ημέρες, Ροδακινιά: 14 ημέρες, Τομάτα: 7 ημέρες, Αγγούρι: 7 ημέρες, Πατάτα: 14 ημέρες, Βαμβάκι: 28 ημέρες, Καπνός: 7 ημέρες

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεγλιάνονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται σε χώρο ξηρό, δροσερό και χωρίς να εκτίθεται απ' ευθείας στο φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:



TIDO 20 SL

Τίντο

Εντομοκτόνο

Πυκνό Διάλυμα (SL)

Εγγυημένη Σύθεση : Imidacloprid 20 % (β/ο)
Βοηθ. ουσίες: 82,4 % β/β

Διασυστηματικό εντομοκτόνο,
επαφής και στομάχου

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αριθ. Εγκρ. Κυκλ: 14231 / 26.03.2008

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.
C/ Alcalá, 498 - 2ª Planta MADRID - SPAIN; Postal Code: 28027
Tel.: +34 91 3273200 Fax: +34 91 3047172 E-mail: global@tradecorp.saptec.pt

Υπεύθυνος Επικοινωνίας – Διανομέας :



ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
Δ. Γλυνού 32, Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378
ypsilon-agro@ypsilon-agro.com, www.ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο 1 λίτρο

Πεδίο εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα επεμβάσεων (ημέρες)
		κ.εκ σκευάσματος /100λίτρα ψεκαστικού υγρού	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ	κ.εκ./στρ		
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-Φρουτ)	Εριώδη αλευρώδη (<i>Aleurothrixus piceosus</i>)	75	200-400	150-300	Ψεκασμός φυλλώματος Εφαρμόζεται στο χρονικό διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου με την εμφάνιση των νυμφώντων εντομο(στάδια L1 & L2)	2 / 20-30
	Φυλλοκνίστης <i>Phyllocnistis citrella</i>	50-75*	200-400	100-300	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής	
Αχλαδιά	Ψύλλα αχλαδιάς (<i>Cacopsylla pyri</i>)	60	150	90	Με την έναρξη της προσβολής. Μπορεί να εφαρμοστεί στις ελιές περιόδους: Πρωτοβάθμια μέχρι το στάδιο ενάραξης λευκής κορυφής (BBCH:54) και μετά την καρπώση έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71-79)	1
Ροδακινιά	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> <i>Myzus nicotianae</i>)	25-30*	150-250	37,5-75	Με την έναρξη της προσβολής. Μπορεί να εφαρμοστεί στις ελιές περιόδους: Πρωτοβάθμια μέχρι το στάδιο ενάραξης λευκής κορυφής (BBCH:54) και μετά την καρπώση έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71-79)	2 / 28
Τομάτα υπαίθρου	Αφίδες (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>) Αλευρώδη (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	50	50-100	25-50	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής	2 / 14
Τομάτα θερμοκηπίου	Αλευρώδη (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	—	—	75-125 κ.εκ.(5)	Ριζοπότησας με το νερό της άρδευσης	2 / 14
Αγγούρι θερμοκηπίου & υπαίθρου	Αλευρώδη (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	—	—	75-125 κ.εκ.(5)	Ριζοπότησας-Προληπτική εφαρμογή.	2 / 14
Βαμβάκι	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i>)	—	50-80	50	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής	2 / 14
Πατάτα	Αφίδες (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>) Δορυφόρος (<i>Leptothorax decemlineata</i>)	—	50-100	50	Με την έναρξη της προσβολής και μέχρι 4 αφίδες ανά φύλλο. Να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει μελίτωμα	2 / 14
Καπνός	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> <i>Myzus nicotianae</i>)	25-60	50 – 100	25 – 30	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται με την επανεμφάνιση της προσβολής	2 / 20-30
		—	—	50- 100 (ανάλογα με την πυκνότητα φυτών)	Ριζοπότησας με το νερό της μεταφύτευσης	1

* το εύρος των δόσεων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβολής.