

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
(Φενοξυκάρμπ) 25%

Εντομοκτόνο

TSESTAK 25 WG



TSESTAK 25 WG

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά)	Κηροπλάστης (Ceroplastes sp.) Λεκάνιο (Saissetia oleae)	20-40	Μόλις εμφανιστούν οι κινητές μορφές.
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά)	Φυλλορύκτες (Phylloxera corylifoliella, Ph blancardella, Chemiosstoma scitella, Lyonetia sp.)	50	Με την έναρξη της εναπόθεσης των αυγών, που συνήθως συμπίπτει με το μέγιστο της πτήσης των ακμιαίων.
	Φυλλοδέτες	40 (με τουλάχιστον 150 lt ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα)	Ψεκασμοί εναντίον των προνυμφών του τελευταίου σταδίου.
	Καρπόκαψα (Cydia pomonella) Ψύλλα αχλαδιάς (Psylla pyri)	40 100	Με την έναρξη των πρώτων εναποθέσεων. Κατά την άνοιξη μέχρι και τις αρχές του καλοκαιριού που ο πληθυσμός είναι ακόμα χαμηλός και δεν υπάρχει υπέρθεση των γενεών, ιδίως κατά την ένταξη του σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης.
	Κοκκοειδή (Quadraspidiotus perniciosus)	150	Όταν τα 2/3 του πληθυσμού είναι σε κινητά στάδια.
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ	Φυλλοδέτες	40 (με τουλάχιστον 150 lt ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα)	Ψεκασμοί εναντίον των προνυμφών του τελευταίου σταδίου.
	Κοκκοειδή (Quadraspidiotus perniciosus, Pseudalacapsis pentagona)	150	Όταν τα 2/3 του πληθυσμού είναι σε κινητά στάδια.
ΑΜΠΕΛΙ	Ευδεμίδα (Pollychrosis Botrana) Κογγυλίδα (Euroscilla ambicueilla)	20-40	Με την έναρξη των πρώτων εναποθέσεων των αυγών.
ΕΛΙΑ	Λεκάνιο (Saissetia oleae)	40	Όταν το 65 % του πληθυσμού είναι σε κινητά στάδια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μέγιστος Αρ. εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο, μεσοδιάστημα επεμβάσεων: Εσπεριδοειδή:1, Μηλοειδή: 2/14, Ροδακινιά: 2/14, Αμπέλι: 2/14, Ελιά: 1. Οι προαναφερθείσες δόσεις, σε όλες τις καλλιέργειες, αφορούν σε ποσότητα 150 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα . Εάν ανά στρέμμα η ποσότητα του ψεκαστικού υγρού είναι μεγαλύτερη, τότε πρέπει να ρυθμιστούν ανάλογα οι δόσεις ανά 100 λίτρα. Το εύρος των δόσεων (όπου υπάρχει) εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.



TSESTAK 25 WG

Εντομοκτόνο

Φενοξυκάρμπ (Φενοξυκάρμπ) 25%

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε
- Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
- Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό
- Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων
- Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας αφού τα πλύνετε καλά με νερό
- Ζητείστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :
Μεταφέρετε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο και προστατέψτε τον από την υποθερμία. Σε περίπτωση υποθερμίας καλέστε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύντε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύντε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης και εφόσον ο παθών έχει τις αισθήσεις του, χορηγήστε σε επανάληψη ενεργό άνθρακα με μεγάλη ποσότητα νερού. Μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομα που δεν έχουν τις αισθήσεις τους. Μην προκαλέσετε εμετό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡ. : 210 7793777

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΑ
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεσή του επικινδύνου απόβλητα.



YPSILON®

TSESTAK 25 WG

Εντομοκτόνο

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Φενοξυκάρμπ (Φενοξυκάρμπ) 25%

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Φενοξυκάρμπ : 25 % B/B
Βοηθητικές ουσίες : 73,96% B/B

ΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑ ΔΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
Εμποδίζει τη μεταμόρφωση των προνυμφών ή την εκκόλαψη των αυγών (ωοκτόνο και προνυμφοκτόνο δράση) δεν έχει ακμαιοκτόνο δράση.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς

Αρ. Εγκρίσεως Κυκλοφορίας Υπ. Γεωργ.: 14225 / 17-03-2008

Τυποποιητής: Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία
Συσκευαστής: Chemia Spa, Italy
Παρασκευαστής - Διανομέας:



YPSILON A.E.
Δ. Γληνού 32, Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com | www.ypsilon-agro.com

Καθαρό βάρος: 400 γραμ.



TSESTAK 25 WG

Εντομοκτόνο

Φενοξυκάρμπ (Φενοξυκάρμπ) 25%

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Εσπεριδοειδή: 45 ημέρες
Ελιά: 60 ημέρες
Μηλιά, Ροδακινιά, Αμπέλι: 21 ημέρες
Αχλαδιά: 35 ημέρες

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
• Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά τα 3/4 με νερό.
• Ρίχνουμε χωρίς προδιάλυση την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος.
• Αναδεύουμε καλά και συμπληρώνουμε μέχρι επάνω με νερό.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
Το εντομοκτόνο TSESTAK 25 WG δεν είναι φυτοτοξικό, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Ειδικά όταν χρησιμοποιείται στην αχλαδιά, να μην συνδυάζεται με ορυκτέλαια.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:
Αποθηκεύεται στην αρχική αραβίαση συσκευασίας σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σ' αυτές τις συνθήκες σταθερό για (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Οι σακούλες και οι σάκοι ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: