

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Να φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μακριά από κατοικημένους χώρους. • Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε και μην καπνίζετε. • Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις. • Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. • Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. • Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να αναποθεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων. • Ζητείστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την διάθεση του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

Πρώτες βοήθειες:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει αντιδοτό. Ακολουθείστε συμπωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και χρήσεις εφαρμογής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα με αλκαλική αντίδραση (βορνιάλειος πολτός κλπ) και με θερινούς πολτούς. Το σκεύασμα δεν πρέπει να εφαρμόζεται πριν περάσουν 30 ημέρες από τον τελευταίο ψεκασμό με θερινούς πολτούς. Σε περίπτωση ανάμιξης με περισσότερα φυτοφάρμακα, καλόν είναι να γίνεται προηγούμενως μία δοκιμή συνδυαστικότητας σε μικρή έκταση.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Διατηρείται στην αρχική του παραφάστια συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες από 10-35° C. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:




ΥΨΙΛΟΝ®

Προπαμίτ

PROPAMITE 57EW

Ακαρεοκτόνο

Γαλάκτωμα σε νερό (EW)

Προπαρζιτ (propargite) 57%

Εγγυημένη Σύνθεση: Propargite 57 % B/O

Βοηθητικές ουσίες: 41,36 % B/B

Ακαρεοκτόνο με εκλεκτική δράση που δρα εξ' επαφής και με ατμούς

- Τοξικό όταν εισπνέεται
- Ερεθίζει το δέρμα
- Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών
- Πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων επιδράσεων.
- Υποπτο καρκινογένεσης

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ**

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΠΙΓΕΙΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΥΔΑΤΑ**

Αρ εγκρ. κυκλοφορίας: 2093 / 1.05.2002

Κάτοχος της Έγκρισης- Παρασκευαστής- Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:
Chemtura Italy, Srl, Italia

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:

Κ.Σ. Παπαδόπουλος Δ. Γούναρη 4, 546 21 Θεσσαλονίκη

Διανομέας:


ΥΨΙΛΟΝ®

ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.

Δ. Γληνού 32, Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49

Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378

e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com | www.ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

**ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ
ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Αμυγδαλιά, Καρυδιά: Κόκκινος Τετράνυχος (Panonychus ulmi), Κίτρινος τετράνυχος (Tetranychus urticae), Άλλα ακάρεα (Tetranychidae, κλπ), Aculus cornatus. Δόση: 80-100 κ.εκ./100 λίτρα νερό.

Ψεκασμοί μετά τα μέσα Ιουνίου μέχρι αργά το καλοκαίρι, εναντίον των προνυμφών και ακμιαίων και επανάληψη των ψεκασμών εφόσον χρειαστεί.

ΜΗΛΙΑ: Κόκκινος τετράνυχος (Panonychus ulmi), Κίτρινος τετράνυχος (Tetranychus urticae). Δόση: 80-100 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ψεκασμοί μετά τα μέσα Ιουνίου μέχρι αργά το καλοκαίρι, εναντίον των προνυμφών και ακμιαίων και επανάληψη των ψεκασμών εφόσον χρειαστεί.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Κερασιά, βερικοκιά, βυσσινιά, δαμασκηνιά, ροδακινιά: Κόκκινος τετράνυχος (Panonychus ulmi), Κίτρινος τετράνυχος (Tetranychus urticae), Άλλα ακάρεα (Tetranychidae, κλπ), Aculus cornatus. Δόση: 80-100 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ψεκασμοί μετά τα μέσα Ιουνίου μέχρι αργά το καλοκαίρι, εναντίον των προνυμφών και ακμιαίων και επανάληψη των ψεκασμών εφόσον χρειαστεί.

ΑΜΠΕΛΙ: Κόκκινος τετράνυχος (Panonychus ulmi), Κίτρινος τετράνυχος (Tetranychus urticae, Tetranychus carpini, T.atlanticus, T.cinnabarinus, T.McDanieli). Δόση: 80-100 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Εφαρμογή: 15-20 ημέρες μετά την άνθηση.

ΒΑΜΒΑΚΙ: Τετράνυχος (Tetranychus urticae). Δόση: 100-250 κ.εκ./ στρέμμα. Εφαρμογή: Με την εμφάνιση των προνυμφών ή των ακμιαίων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Στις **μηλιές** δεν πρέπει να εφαρμόζεται πριν από τα μέσα Ιουνίου. Εφαρμόζονται 1-3 ψεκασμοί το χρόνο, με 200-250 λίτρα ψεκαστικό υγρό ανά στρέμμα.
2. Στις **πυρήνoκαρπα** εφαρμόζονται 1-2 ψεκασμοί το χρόνο, με 200-250 λίτρα ψεκαστικό υγρό ανά στρέμμα.
3. Στο **αμπέλι** γίνεται μία εφαρμογή με 150 λίτρα ψεκαστικό υγρό ανά στρέμμα.
4. Στο **βαμβάκι** μην ψεκάσετε νεαρά βαμβάκοφυτα κάτω των 25εκ. Γίνεται μία εφαρμογή και το εύρος των δόσεων διαφοροποιείται ανάλογα με την ανάπτυξη των βαμβάκοφυτών. Χρησιμοποιούνται δηλ. 100κ.εκ./στρέμμα για φυτά ύψους 25-30εκ. και 200-250 κ.εκ./στρέμμα σε μεγάλα βαμβάκοφυτα, με 40-50 λίτρα ψεκαστικό υγρό ανά στρέμμα.
5. Για καλύτερα αποτελέσματα, ψεκάστε κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Γενικά μη ψεκάστε όταν υπάρχουν προβλήματα ήρασιας, προβόλες από έντομα, ασθένειες ή νηματοειδείς, τροφονεμίες, ή όταν τα φυτά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Πρέπει πάντα να γίνεται καλός ψεκασμός ώστε να επιτυγχάνεται καλό λούσιμo των φυτών και ειδικότερα των φύλλων και στις δύο επιφάνειες.
6. Η διάρκεια δράσης του Propamite είναι μεγαλύτερη από 30 ημέρες, γι' αυτό οι ψεκασμοί πρέπει να επαναλαμβάνονται μόνο εφόσον εμφανισθούν εκ νέου ακάρεα.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση. Ανακινούμε καλά τη φιάλη και αραιώνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνουμε στη συνέχεια με το απαιτούμενο νερό σε συνεχή ανάδευση.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος με καλό λούσιμo των φυτών.

Τελευταίαεπέμβαση πρίντη συγκομιδή: Μηλιές-Πυρήνoκαρπα: 7 ημέρες
Βαμβάκι: 14 ημέρες
Λοιπέςκαλλιέργειες: 21 ημέρες