

Προφυλάξεις: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε. • Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε μετά τον ψεκασμό. • Να μην χρησιμοποιείτε από έγγυες γυναίκες ή παρουσία εγγύων γυναικών.

Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

Πρώτες βοήθειες - Αντιδοτό: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να μην προκληθεί εμετός. Μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,

μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:



YPSILON

CONFER 10 EC

Μυκητοκτόνο Κονφέρ

Υγρό γαλακτοματοποίηση (EC) penconazole (πενκοναζόλ) 10%
Εγγραμμένη σύνθεση: penconazole 10% β/ο
βοηθ. ουσίες 89,67 % β/β

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

• Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά την διάρκεια της κύησης.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες

Αρ. Εγκρ. Κυκλοφορίας: 60. 233 / 23-12-2008

Κάτοχος Έγκρισης- Παρασκευαστής-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. - Ισπανία

Διανομέας:



YPSILON A.E.

Δ. Γλυκού 32, Βασιλίσσας, Θεσσαλονίκη, 542 49

Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378

e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com www.ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο: 50 κ.εκ.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΔΟΣΕΙΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ: Δίδιο (*Podospaera oxyacanthae*): 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 52-125 κ.εκ./στρ. Στην πτώση των πετάλων, στην απόσπαση του κάλυκα και 20 ημέρες αργότερα.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ: Δίδιο (*Sphaerotheca pannosa*): 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 52-125 κ.εκ./στρ. Στην πτώση των πετάλων, στην απόσπαση του κάλυκα και 20 ημέρες αργότερα.

ΑΜΠΕΛΙ: Δίδιο (*Uncinula necator*): 25-40κ.εκ./100 λίτραψεκ. υγρό ή 12,5-επεμβάσεις με το σκεύασμα να μην ξεπερνούν τις δύο (2) ανά 60 κ.εκ./στρ. Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων και εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, ψεκασμοί όταν οι βλαστοί αποκτήσουν 2-3 φύλλα και κατά την άνθηση. Οι ψεκασμοί μπορούν να συνεχιστούν ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: (Πεπόνι, Καρπούζι): **Δίδιο (*Sphaerotheca spp.*):** 25-35 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 12,5-35 κ.εκ./στρ. 1-3 ψεκασμοί: Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες. Η μικρή δόση συνιστάται για ψεκασμούς κάθε 7-14 ημέρες και η μεγάλη κάθε 10-16 ημέρες.

ΚΑΠΝΟΣ: Δίδιο (*Erysiphe cichoracearum*): 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 17,5-75 κ.εκ./στρ. 2-3 ψεκασμοί σε όλα τα στάδια με μεσοδιαστήματα 14 ημέρες.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: Δίδιο (*Sphaerotheca spp.*): 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 17,5-50 κ.εκ./στρ. Μέχρι 5 ψεκασμοί ανάλογα με την ένταση της προσβολής και μεσοδιαστήματα 14 ημέρες.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: Βερικοκιά, Ροδακινιά: 150-250 λίτρα/στρ., Αμπέλι: 50-150 λίτρα/στρ., Κολοκυνθοειδή: 50-100 λίτρα/στρ., Καπνός: 50-150 λίτρα/στρ., Καλλωπιστικά υπαίθρου: 50-100 λίτρα/στρ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Βερικοκιά, Ροδακινιά: 3, Αμπέλι: 2, Κολοκυνθοειδή: 3, Καπνός: 3, Καλλωπιστικά υπαίθρου: 5.

Παρατηρήσεις: • Η μικρή δόση να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις χαμηλής πίεσης προσβολής. • Στο αμπέλι η εφαρμογή του πρέπει απαραίτητα να εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα επαφής και οι καλλιεργητική περίοδο

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: • Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. • Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσεως.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρίπτυμα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: • Βερικοκιά, Ροδακινιά: 21 ημέρες, • Αμπέλι: 35 ημέρες, • Πεπόνι, Καρπούζι: 3 ημέρες, • Καπνός: 21 ημέρες.

181x44