

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: ● Να φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. ● Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. ● Μην τρώτε ή πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. ● Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. ● Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκάσιμο. ● Το υλικό και ο περιεκτικός του να θεωρηθούν κατά την διάθεση τους επικινδύνους απόβλητα. ● Αποφυγείτε την διάθεση στο στομάχι με νερό, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλέσετε εμετό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντιδότο. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Πυρηνόκαρπα-αμυγδαλιά : Πτώση των πετάλων. Καλλιεργούμενα μανιτάρια: 10 ημέρες. Σπύρι-κριθάρι: 56 ημέρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση, προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος και συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό. Σε περίπτωση ενσωμάτωσης σε υδατοδιαλυτούς κηρούς, συνιστάται να γίνεται πρώτα ανάμειξη ενός μέρους **MIRACULIX 45EC** με 10 μέρη νερό και ανάδευση μέχρι να γίνει γαλάκτωμα. Το γαλάκτωμα αυτό προστίθεται στο διάλυμα κηρού και αναδεύεται για 15 λεπτά τουλάχιστον στις 1500 στροφές/λεπτό.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: α. **Εσπεριδοειδή:** εμβάπτιση των καρπών για 25-30 δευτερόλεπτα ή ψεκάσιμος τους κατά τη συσκευασία.

β. **Πυρηνόκαρπα-Αμυγδαλιά-Σπύρι-Κριθάρι:** ψεκάσιμος φυλλώματος.

γ. **Μανιτάρια:** ψεκάσιμος του υποστρώματος.

δ. **Τριανταφυλιά:** ψεκάσιμος φυλλώματος μέχρι απορροής.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα **MIRACULIX 45EC** δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής υπό τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Σε ορισμένα είδη μανιταριών μπορεί να παρατηρηθούν κάποιοι κακοσηματισμοί ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη, χωρίς όμως αυτό να επιδρά στις τελικές αποδόσεις.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το **MIRACULIX 45EC** συνδυάζεται με τα περισσότερα από τα κοινώς χρησιμοποιούμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Σε περίπτωση συνδυασμού με άλλα γεωργικά φάρμακα ή με κηρούς προσθέστε τελευταίο το **MIRACULIX 45EC**.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, στην αρχική του απαράβαστη συσκευασία. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρίψιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:



MIRACULIX 45 EC

Μιράκουλιξ

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC) Prochloraz (Προχλωράζ) 45 %

Εγγυημένη Σύμβαση: Prochloraz 45 % β/ο
Βοηθ. Ουσίες: 58,94% β/β



Μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση.

● **Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ**

Αρ. Εγκρ. Κυκλοφορίας: 60.234 / 23-12-2008

Κάτοχος της Έγκρισης: GAT Microencapsulation AG, Αυστρία.
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση - Υπεύθυνος επικοινωνίας:



YPSILON A.E.
Δ. Γληνού 32, Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com
www.ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο 750 κ.εκ.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΤΟΧΟΣ, ΔΟΣΕΙΣ, ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.	Μέγιστη δόση κ.εκ./ στρ.	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο
Πυρηνόκαρπα Ροδακιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά	Φαία σήψη (Monilia spp)	60	200	120	3 εφαρμογές στα στάδια: 1. 1-2% της άνθησης 2. στην πλήρη άνθηση 3. στην πτώση των πετάλων	3
Αμυγδαλιά	Φαία σήψη (Monilia spp)	60	200	120	3 εφαρμογές στα στάδια: 1. 1-2% της άνθησης 2. στην πλήρη άνθηση 3. στην πτώση των πετάλων	3
Καλλιεργού- μενα μανιτάρια	Ξηρή σήψη (Ventilium fungicola) Υγρή σήψη (Mycogone perniciosa) Αραχνοειδής ιστός (Hyromyces rosellus)		1-2 ψεκ. υγρού l/μ.	3 κ.εκ./t.μ.	Εφαρμογή 5-7 μέρες μετά την επικάλυψη.	1
Τριανταφυλιά	Όidio (Sphaerotheca pannosa) Μελανιά κηλιδωτή φυλλων (Diplocarpon rossae) Γεφρά σήψη (Botrytis cinerea)	50-100			Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη εφόσον υπάρχει πρόβλημα ανά 10-14 ημέρες.	
Καρποί στεριδοειδών	Σήψεις από Penicillium digitatum, P. italicum ή 420-630 (διάλυμα υδατοδιαλυτού κηρού)	105-210			Μετασυσλεκτικά κατά τη συσκευασία.	1
Σπύρι-Κριθάρι	Όidio (Eysiphe graminis) Σεπτωρίωση (Septoria spp) Φουζαριώσεως (Fusarium spp) Παρασιτικό πλάγισμα (Cercospora herpotrichoides) Ελμινθοσπορίωση (Helminthosporium spp.) Ρυγχόσποριση (Rhynchosporium secalis)	65-105	20-40	13-42	Μία εφαρμογή μετά το τέλος του αδελφώματος και εφόσον εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα ασθενειών.	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Στις καλλιεργείες πυρηνόκαρπων (συμπεριλαμβανομένης και της αμυγδαλιάς) και στις περιοχές που εφαρμόζονται προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων να ακολουθούνται οι σχετικές οδηγίες τους.
2. Οι μικρές δόσεις αφορούν πρόληπτικές εφαρμογές και οι μεγάλες θεραπευτικές.
3. Να μην ψεκάτετε αν πρόκειται να βρέξει μέσα στις επόμενες 3 ώρες.
4. Η διάρκεια δράσης του είναι 4-6 εβδομάδες.