

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
- Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

**Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.**

### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΑΘΟ

- Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
- Μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του.
- Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**

### Επιβαλλές για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

### Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον.

Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

### ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

#### ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.



Συστέιν®

# SYSTHANE

## 4,5 EW

Μυκητοκτόνο

Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)

myclobutanil (μυκλομπουτανίλ) 4,5%

**Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση**

Εγγυημένη Σύνθεση: myclobutanil 4,5% B/O  
Βοηθ. ουσίες: 95,03% B/B

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Αριθμός εγγραφής κυκλοφορίας: 60146 / 23-1-2008



**Dow AgroSciences**

Παρασκευαστής: DOW AGROSCIENCES SWITZERLAND S.A., Ελβετία

Τυποποιητής: DOW AGROSCIENCES B.V. Mozzanica, Ιταλία

Συσκευαστής: AGRONOMOY ΠΑΠΑΘΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ, Θεσσαλονίκη

Κάτοχος της έγκρισης - Υπευθύνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:



ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.

Δ. Πλινού 32, Βούλαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49

Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378

e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com | www.ypsilon-agro.com

**Περιεχόμενο 500 κ.εκ.**

### ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**ΜΗΛΟΣΙΔΗ: ΜΗΛΙΑ: Φουζικλάδιο** (Venturia inaequalis), **Πιδίο** (Podosphaera leucotricha) **Δόση:** 80-105 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκαστού υγρού: 100-200 λίτρα/στρ. Εφαρμογή στα στάδια πράσινης, ροδίνης κορυφής, πτώσης πετάλων και 10-15 μέρες αργότερα (καρπίδιο).

**ΑΧΛΑΔΙΑ, ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ: Φουζικλάδιο** (Venturia pirina) **Δόση:** 80-105 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστού υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-200 λίτρα/στρ. Εφαρμογή στα στάδια πράσινης κορυφής, λευκής κορυφής, πτώσης πετάλων και 15-20 ημέρες αργότερα.

**ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ: Πιδίο** (Podosphaera oxycanthae, Sphaerotheca pannosa), **Δόση:** 80-105 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 150-250 λίτρα/στρ. Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στην πτώση των πετάλων, η δεύτερη στην απόσταση του κλάδου και η τρίτη 20 ημέρες αργότερα.

**ΑΜΠΕΛΙ: Πιδίο** (Uncinula necator) **Δόση:** 45-65 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-150 λίτρα/στρ. Βασική εφαρμογή την άνοιξη όταν έχουν εκπτυχθεί 2-3 φύλλα και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες.

**ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ: Πιδίο** (Sphaerotheca spp., Erysiphe spp., Oidium sp.), **Δόση:** 105-130 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα.

**ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ: Πιδίο** (Sphaerotheca pannosa), **Μελανή κηλίδωση** (Diplorcarpon rosae) **Δόση:** 105-130 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-14 ημέρες.

**ΓΑΡΙΦΑΛΙΑ: Σκωρίωση** (Phragmidium spp.) **Δόση:** 105-130 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

**ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ/ΣΤΡΕΜΜΑ:**

**ΜΗΛΟΣΙΔΗ:** 210 κ.εκ./στρ. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:** 260 κ.εκ./στρ. **ΑΜΠΕΛΙ:** 100 κ.εκ./στρ. **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ:** 130 κ.εκ./στρ. **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ:** 130 κ.εκ./στρ. **ΓΑΡΙΦΑΛΙΑ:** 130 κ.εκ./στρ.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η μικρή δόση συνιστάται για προληπτικές και η μεγάλη για θεραπευτικές εφαρμογές.
2. Στις καλλιέργειες αμπέλι, μηλосιδη, πυρηνόκαρπα και κολοκυνθοειδή υπό κάλυψη να ακολουθούνται στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προεπιδοτήσεων.

**ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:** Μηλιά-Αχλαδιά-Μουσουμιά 4, Πυρηνόκαρπα 3, Αμπέλι 3, Κολοκυνθοειδή 5, Τριανταφυλλιά-Γαρίφαλα 5.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός καλύψεως.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά και αναδεύοντας προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευσή.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδραση.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** • ΜΗΛΟΣΙΔΗ, ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ, ΑΜΠΕΛΙ: 21 ημέρες  
• ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: 7 ημέρες

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:  
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Βλέπε φιάλη

