

**Προφυλάξεις:** • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δειξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). • Το υλικό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών απόβλητων. • Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

**Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

**Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο:** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δειξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). Αντίδοτο. Δεν υπάρχει αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Αλληλεπίδρασης: (210) 77 93 777.

**Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.**

**Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.**

**Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.**

**Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.**

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ:** • Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. • Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. • Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από αραβόσιτο ή σόργο πριν περάσουν 10 μήνες από την εφαρμογή του. • Αποφύγετε τη χρήση του σε πολύ αμμώδη, ελαφρά, φτωχά σε οργανική ουσία (<1%) εδάφη σε περιοχές με πολλές βροχοπτώσεις. • Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. • Αν ρυπαίνονται τα νερά αρδύσεως να μην χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση. • Μην ψεκάσετε όταν φυσάει. • Μη διπλοψεκάσετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνεται τις δόσεις. • Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 atm (45 PSI). • Χρησιμοποιείτε μεκτε τύπου σκούπας. • Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συστώνται. • Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με άφθονο νερό και απορρυπαντικό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Χρονική σταθερότητα σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:** Να αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, στην αρχική του απαράβιαστη συσκευασία, σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:**

  
**ΥΨΙΛΟΝ®**

Ντόριαν

# DORIAN 50 SC

## Ζιζανιοκτόνο

### Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: terbuthylazine: 50% β/ο  
βοηθητικές ουσίες: 52.6% β/β

**Εκλεκτικό προφυτρωτικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, με υπολειμματική δράση, για την καταπολέμηση των πλατύφυλλων και ορισμένων αγρωστώδων ζιζανίων στο καλαμπόκι. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και μεταφέρεται στα φύλλα όπου δρα παρεμποδίζοντας τη φωτοσύνθεση.**

• **Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ**

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 7884 / 23-10-08

Τυποποιητής - Συσκευαστής: **Chemia Spa, Italy.**  
Κάτοχος της Έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Παρασκευαστής- Διανομέας:

  
**ΥΨΙΛΟΝ®**

ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.  
Δ. Πλινού 32, Βούλαρα, Θεσσαλονίκη, 542 49  
Tηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378  
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com  
www.ypsilon-agro.com

**Περιεχόμενο: 1 λίτρο**

### Φάσμα δράσης:

Καλλιέργεια	Στάχοι	Δόσεις κ.ε.κ. ανά στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα ανά στρέμμα)	Χρόνος εφαρμογής
Αραβόσιτος	Ετήσια πλατύφυλλα και μερικά αγρωστώδη ζιζάνια <sup>(1)</sup>	150-200 <sup>(2)</sup>	30-50	<b>Προφυτρωτικά</b> <sup>(3)</sup> μετά τη σπορά της καλλιέργειας ή <b>Μεταφυτρωτικά</b> , έως τα 3-5 φύλλα (περίπου 10 εκ. ύψος)

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

##### (1) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

**Πλατύφυλλα:** Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus*), Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Κοινή Πόα *Poa annua*, Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*), Αγριοσινάπι (*Sinapis arvensis*), Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*), Ζωχός (*Sonchus oleraceus*), Στελλάρια (*Stelaria media*), Αγριοραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*).

**Ανθεκτικά ζιζάνια:** Αγριοπαμπακιά (*Abuthylon theophrasti*), Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*), Τάτουλας (*Datura stramonium*), καθώς και πολυετή ζιζάνια που πολλαπλασιάζονται με ριζώματα, κονδύλους ή βολβούς.

(2) Η χαμηλή δόση να εφαρμόζεται σε ελαφρά, ενώ η υψηλότερη σε μέσης ή βαριά σύστασης εδάφη.

(3) Μετά την εφαρμογή, εάν δεν ακολουθήσει βροχή τουλάχιστον 10-15 χιλιοστών εντός δύο εβδομάδων, να γίνεται ενσωμάτωση με ελαφρύ πότισμα.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους με 30-50λίτρα νερό / στρέμμα, με πίεση μικρότερη από 3 atm. (45 psi).

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το ψεκαστικό με νερό μέχρι την μέση. Αραιώστε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Ξεπλύνετε το δοχείο με νερό τουλάχιστον 3 φορές, ρίχνοντας τα αποβλήματά στο ψεκαστικό.

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες καλαμποκιού, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις δόσεις και τους χρόνους εφαρμογής.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** 60 ημέρες

