

Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία: • Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις. • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. • Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια. • Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση. • Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα: Γενικά: Μετακινείτε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο ή σε καθαρό αέρα και προστατεύστε τον από υποθερμία. Συμβουλευτείτε προληπτικά γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί και ξεπλύνετε τα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα με νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή άμεσα. Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε τη συσκευασία, την ετικέτα ή το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, εάν είναι δυνατόν. Μην προκαλέσετε εμετό. Ιατρικές οδηγίες: Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει αντίδοτο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Μέτρια βλαβερό για τα ωφέλιμα αρθρόποδα.

Το υλικό και ο περιεκτής του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα

Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτία δεδομένων ασφαλείας.

Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ: • Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. • Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. • Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 2 μήνες από την εφαρμογή του. • Αποφύγετε την χρήση του σε πολύ αμμώδη εδάφη. • Μη ρυπαίνετε τις γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. • Εάν ρυπανθούν τα νερά αρδεύσεως, να μη χρησιμοποιηθούν πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή του. • Μην ψεκάσετε όταν φυσάει. • Μη διπλοψεκάσετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. • Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 atm (45 PSI). • Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας. • Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δε ονισιτάται. • Μετά τον ψεκασμό πλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Παραμένει σταθερό για (δύο) 2 χρόνια εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο και σε συνθήκες θερμοκρασίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Βλέπε φιάλη



ΥΨΙΛΟΝ®

YPSILON ΦΛΟΡΙΝ
F L O R I N
12,5 EC
Ζιζανιοκτόνο

Υγρό γαλακτωματοποίηση (EC)

Εγγυημένη Σύνθεση: fluzazifop-P-Butyl 12,5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 85,68% β/β

**ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ
ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΕ
ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΕΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ
ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΣΤΟΥΣ
ΥΠΕΡΓΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ**

- Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβριο κατά την διάρκεια της κύησης.
- Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 7848/28-1-2008

Τυποποιητής - Συσκευαστής: CHEMIA s.p.a, Ιταλία
Παρασκευαστής - Διανομέας:

ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
Δ. Γλινού 32, Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com | www.ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο: 1 λίτρο



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Ζαχαρότευτλα Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: Αγριοβρώμη (*Avena spp.*), Μουχρίτσα (*Echinochloa spp.*), Σετάρια (*Setaria spp.*) 100-200 (1) κ.εκ. / στρέμμα. Όταν τα ετήσια ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα.

Αμέλι (για οινοποίηση και επιτραπέζια σταφύλια) Πολυετής αγρωστώδη ζιζάνια. α) Βελιούρας (*Sorghum spp.*) 600 κ.εκ. / στρέμμα. β) Αγριάδα (*Cynodon dactylon*) 800-1000 κ.εκ. / στρέμμα. Όταν τα πολυετή ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης (15-50 εκ. ύψος).

Εσπεριδοειδή Γκρέιπ φρούτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά: Αγρωστώδη ζιζάνια α) Ετήσια. β) Πολυετή (3). 60-120 κ.εκ. / στρέμμα (2). α) Όταν τα ετήσια ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα. β) Όταν τα πολυετή ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης (15-50 εκ. ύψος).

Βαμβάκι, Τριφύλλι για σπόρο, Καπνός, Σόγια, Ηλιάνθος, Πατάτα, Φακή. Αγρωστώδη ζιζάνια α) Ετήσια β) Πολυετή (3). 100-250 κ.εκ. / στρέμμα (2) (απαιτείται προσθήκη ελαιού ή διαβρεκτικού). α) Όταν τα ετήσια ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα. β) Όταν τα πολυετή ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης (15-50 εκ. ύψος).

Μαρούλι Ετήσια αγρωστώδη 125-150 κ.εκ. / στρέμμα. Όταν τα ετήσια ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα. Πολυετή 150-200 κ.εκ. / στρέμμα. Όταν τα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης.

Τομάτα Υπαίθρου (βιομηχανική) Ετήσια αγρωστώδη *125-150 κ.εκ. / στρέμμα Όταν τα ετήσια ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα. Βελιούρας 150-200 κ.εκ. / στρέμμα. Όταν ο βελιούρας βρίσκεται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο : 1
ΌΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 30-60 (λίτρα/στρέμ.).**

Παρατηρήσεις:

- 1 Στα ζαχαρότευτλα για τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια και ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους, η χαμηλή δόση εφαρμόζεται στα μικρά ζιζάνια και η υψηλή στα μεγάλα.
- 2 Οι χαμηλές εφαρμόζονται στα ετήσια ζιζάνια και οι υψηλές στα πολυετή.
- 3 Δεν καταπολεμά την κοινή πόα (*Poa annua*).
- 4 Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια είναι: α) Ετήσια : αγριοβρώμη (*Avena spp.*), ήρα (*Lolium spp.*), σετάρια (*Setaria spp.*), μουχρίτσα (*Echinochloa spp.*), βρώμος (*Bromus spp.*), αλεπονουρά (*Alopecurus spp.*), αματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*), β) Πολυετή : βελιούρας (*Sorghum spp.*).
- 5 Μην εφαρμόζετε το YPSILON FLORIN 12,5 EC σε ζιζάνια που βρίσκονται υπό stress (ξηρασία, χαμηλές θερμοκρασίες, βοσκή). Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος μπορεί να ελαττωθεί όταν το έδαφος είναι στεγνό και η σχετική υγρασία μικρότερη του 60%.
- 6 Δεν επιτρέπεται η χρήση για τομάτες βιομηχανικές βιολογικού κύκλου μικρότερου των 90 ημερών.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλικής επιφάνειας των ζιζανίων, όταν τα πολυετή βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης και τα ετήσια στο στάδιο 1-3 φύλλων, με 30-60 λίτρα νερό/στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε κατά το 1/2-2/3 το ψεκαστικό με καθαρό νερό. Ανακινείτε τις φιάλες με το σκεύασμα και προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα. Ξεπλύνετε τα κενά συσκευασίας πολλές φορές και ρίξτε το νερό στο ψεκαστικό. Συμπληρώστε με την υπολοιπή ποσότητα νερού υπό συνεχή ανδούση **Φυτοτοξικότητα:** Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνηθισμένες δόσεις και καλλιέργειες. Είναι φυτοτοξικό στα σιτηρά.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Ζαχαρότευτλα: 90 ημέρες, Αμέλι: 120 ημέρες, Εσπεριδοειδή-βαμβάκι: 30 ημέρες, Πατάτα: 50 ημέρες, Σόγια ηλιάνθος-τριφύλλι-καπνός: 60 ημέρες, Φακή: 45 ημέρες, Μαρούλι: 42 ημέρες, Τομάτα Υπαίθρου (βιομηχανική): 90 ημέρες.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗ ΦΙΑΛΗ