

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: ●Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. ●Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. ●Μην αναπνέετε εκνεφώματα. ●Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. ●Το υλικό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών απόβλητων. ●Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση. ●Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να μην προκληθεί εμετός.

Αντίδοτο: Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα
Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/ το δελτίο δεδομένων ασφαλείας
Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ:

●Φυλάξτε το χωριστά από άλλα γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. ●Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. ●Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από αραβόσιτο ή σόργο πριν περάσουν 10 μήνες από την εφαρμογή του. Αν αποτύχει η καλλιέργεια του ηλιάνθου μπορεί να επαρθούν ζαχαρότευτλα, αραβόσιτος, φασόλια ή σπανάκι, αφού όμως προηγηθεί όργωμα του ψεκασμένου χωραφιού ●Αποφεύγετε τη χρήση του σε εδάφη αμμώδη, πηλό-αμμώδη και σε εδάφη με οργανική ουσία < 1%. ●Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. Μην αδειάζετε το ψεκαστικό υγρό πιο κοντά από 50 μέτρα από μέρη που έχουν νερό. ●Αν ρυπανθούν τα νερά αρδεύσεως να μη χρησιμοποιηθούν πριν περάσουν 2 μήνες από την εφαρμογή του. ●Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. ●Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. ●Ψεκάστε με πίεση χαμηλότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 psi). ●Χρησιμοποιείτε μικρό τύπου σκούπας. ●Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται. ●Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με πετρέλαιο και μετά με άφθονο νερό και απορριπτακτικό.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε φιάλη



RAZORIN 25CS
GAT (Γκατ Ραζορίν)

Ζιζανιοκτόνο

Αιώρημα μικροκαψουλών (CS)

Flurochloridone 25%

Εγγυημένη σύνθεση: Flurochloridone 25% β/ο
 Βοηθητικές ουσίες: 76,25 % β/β

Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο ετήσιων πλατύφυλλων και μερικών αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τις ρίζες, το στέλεχος και τα κολοόπιλα. Δρα εμποδίζοντας τη σύνθεση των καρωτινοειδών που εμποδίζει τη φωτοσύνθεση της χλωροφύλλης.

- Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας.
- Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
- Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες
Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε αεροψεκασμούς.

Αριθ. Εγκρ. Κυκλ: **7877 / 15 - 7 - 2008**

Κάτοχος της Έγκρισης-Παρασκευαστής-Τυποποιητής-Συσκευαστής:
 GAT Microencapsulation AG, Ebenfurth, Αυστρίας.

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση - Διανομέας:



ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
 Δ. Πλυνού 32, Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49
 Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378
 e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com
 www.ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο 1 λίτρο

Φάσμα Δράσης

	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./στρ)	Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος
Ηλιάνθος	Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και ορισμένων αγρωστωδών ζιζανίων	200- 400	20 - 40	Αμέσως μετά τη σοδιά.	1

Παρατηρήσεις:

- (1) Απορροφάται από τα ριζίδια, το βλαστό και τα κολοόπιλα
- (2) Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια είναι τα: *Digitaria sanguinalis*, (Ανεμόχορτο), *Poa annua* (Πόα κοινή), *Alopecurus myosuroides* (Αλεπονουρά), *Lolium multiflorum* (Ηρα ή πολυάνθη) και *Phalaris ssp* (Φάλαρες).
- (3) Το GAT RAZORIN 25 CS έχει μειωμένη αποτελεσματικότητα στα πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια όπως περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis*) και άλλα.
- (4) Η δόση εξαρτάται από τον τύπο του εδάφους. Όταν η εφαρμογή γίνεται σε βαριά εδάφη, να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη δόση και σε ελαφρά εδάφη, η μικρή δόση.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός στο εδάφος, αμέσως μετά την σοδιά, με 20 -40 λίτρα ψεκαστικού υγρού στο στρέμμα, με χαμηλή πίεση, όχι μεγαλύτερη από 2 ατμ. (30 PSI) και μικρό τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τα 3/4 της απαιτούμενης ποσότητας νερού. Ανακινήστε καλά το σκεύασμα μέσα στη κλειστή συσκευασία του και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση ή ανάκτηση ενέργειας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 3 μήνες

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις Ελληνικές εδαφο-κλιματικές συνθήκες. Τα σταυρανθή, οι μηλιές, τα κολοκυνθοειδή, η τομάτα, το κρεμμύδι, ο καπνός, τα ζαχαρότευτλα και τα αμπέλια είναι πολύ ευαίσθητες καλλιέργειες.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος -Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε ξηρό, δροσερό, σκοτεινό και καλά αεριζόμενο μέρος διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.