

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
• Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην το χρησιμοποιείτε όταν τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. • Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Να χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. • Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων. • Ζητείστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεση τους επικινδύνως απόβλητα. • Αποφύγετε την διάθεση του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/δεληίο δεδομένων ασφαλείας. • Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άθρονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκάσμο. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Σε περίπτωση δηλητηρίασης ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

ΜΕΤΡΙΑ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
Μην ψεκάτε όταν οι μέλισσες είναι παρούσες. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ: Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπέρους. Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. Μην σπέρνετε και μην φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 5 μήνες από την εφαρμογή του. Μη μολύνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό. Παρε αισθηρές προφυλάξεις να μη μολυνθούν γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. Αν ρυπανθούν τα νερά αρδέυσεως να μην χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση. Μην ψεκάτε όταν φυσάει. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 ατμόσφαιρες. Χρησιμοποιείστε μικρ τύπου σκούπας. Μετά τον ψεκάσμο ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με πετρέλαιο και μετά με νερό και απορρυπαντικό.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Φυλάξτε το στην αρχική του συσκευασία σε κανονικές θερμοκρασίες σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον, μακριά από απ'ευθείας έκθεση στο φως. Σ' αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγούμενως με σκίσιμο, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:** **ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:** Στο επάνω μέρος του δοχείου 



YPSILON ZYGOMA 50 SC ΖΥΓΚΟΜΑ
ZYGOMA 50 SC
Ζιζανιοκτόνο

Συμπυκνωμένο Αιώρημα (SC)

Fluometuron (φλουομετουρόν) 50%

Εγγυημένη Σύνθεση: fluometuron: 50% B/O

Βοηθητικές ουσίες: 55,5% B/B



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΟ - ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΜΟΝΟΕΤΩΝ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ & ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ


- Επιβλαβές όταν εισπνέεται
- Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα

ΔΡΑ ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ. ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΛΩΜΑ. ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ.

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 7644/22-8-2006

Τυποποιητής - Συσκευαστής: NUFARM GmbH & Co Linz - Austria

Παρασκευαστής - Διανομέας:

 **ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.**
Δ. Γληνού 32, Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com | www.ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΒΑΜΒΑΚΙ: Ευαίσθητα Ζιζάνια: Αγριοτομάτι (*Solanum nigrum*), Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus galli*), Βλήτο (*Amaranthus spp*), Σετόριες (*Setaria spp*), Χαμομήλι (*Chamomilla regetita*), Λουβουδιές (*Chenopodium album*), Μεγολοκ. Κολλητσιόδα (*Galium aparine*), Ήρες (*Lolium*), Αντράκια (*Portulaca oleracea*), Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*), Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*), Άγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*), Λαπαθο. (*Rumex obtusifolius*) Άγριοπεπέρια (*Polygonum persicaria*) Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*). **Ανθεκτικά Ζιζάνια:** Αγριοβαμβάκι (*Abutilon theophrasti*), Αγριοβίσκος (*Hibiscus trionum*), Μολόχα (*Melva spp*), Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*).

ΔΟΣΗ:

Α). Αμέσως μετά τη σπορά. 250-500 κ.εκ./στρέμμα.

Β). Μεταφύτευτικά. 200 κ.εκ./στρέμμα, όταν το βαμβάκι έχει ύψος 10-15 εκ., με κατευθυνόμενο ψεκάσμο στη βάση των βαμβακοφύτων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

• Οι δόσεις είναι ανάλογα με τον τύπο του εδάφους. Οι μεγαλύτερες δόσεις στα βαριά εδάφη και οι μικρές σε ελαφρά εδάφη.

• Σε 7-10 ημέρες από την εφαρμογή του να ακολουθεί βροχή ή άρδευση με 20-30 κ.μ. νερό / στρ.

• Εάν χρησιμοποιηθεί σε δόση μεγαλύτερη από 400 κ.εκ./στρ. τότε δεν πρέπει να φυτεύονται μετά τη συγκομιδή του βαμβακιού ευαίσθητες καλλιέργειες (σιτάρι, σόγια, φαγόσμηλα, λάχανα, κολοκυνθοειδή, αραχίδα, τομάτα, μελιτζάνα) παρά μόνο αφού περάσει ένας (1) χρόνος.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ομοιόμορφος ψεκάσμος αμέσως μετά τη σπορά και μεταφύτευτικά κατευθυνόμενος ψεκάσμος στη βάση των βαμβακοφύτων όταν έχουν ύψος 10-15 εκ. με 30-60 λίτρα στο στρέμμα. Το ψεκαστικό να λειτουργεί υπό συνεχή ανάδευση με πίεση όχι μεγαλύτερη από 3 ατμ. (45psi) και με μικρ τύπου σκούπας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ : Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινουμε καλά το φάρμακο και διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα φαρμάκου σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται τρεις φορές και τα νερά ρίχνονται στο ψεκαστικό διάλυμα. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Είναι απόλυτα εκλεκτικό για το βαμβάκι και δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ : Δεν συνδυάζεται με θειοκαρβαμικά ζιζανιοκτόνα.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗ ΦΙΑΛΗ