

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.
- Πλύνετε το δοχείο και αποθέστε το με ασφαλή τρόπο.
- Μην ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά μέσα συσκευασίας για κανέναν σκοπό.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία (φόρμα), προστατευτικά γάντια και μάσκα προσώπου όταν χειρίζεστε το σκεύασμα.
- Μην μολύνετε τα επιφανειακά ύδατα ή τα αρδευτικά αυλάκια με το υλικό αυτό ή τον περιέκτη του.
- Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στις αποχετεύσεις. Αποθέστε το υλικό και τον περιέκτη του με ασφαλή τρόπο.
- Μην αναπνέετε αέρια και αναθυμώσεις.
- Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.
- Μετά την επαφή με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό.
- Σε περίπτωση αδιαθεσίας ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατόν).
- Μην χρησιμοποιείτε με κανένα φυτοπροστατευτικό προϊόν που θα εφαρμοσθεί στο ή κοντά σε νερό.
- Προφυλάξτε από τον παγετό.

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210/77 93 777

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Φυλάσσεται σε μέρος ξηρό, δροσερό. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.



TORPEDO-II

Τορπέντο

ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (ΕC)

Περιέχει:

Alkoxylated tallow amine:	210 γρ/κιλό
Alcohol ethoxylates:	380 γρ/κιλό
Natural fatty acids:	75 γρ/λίτρο
Polyalkylene glycol:	210 γρ/κιλό

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΒΕΛΤΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΟΥΛΦΟΥΛΟΥΡΙΩΝ



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

- ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
- ΒΛΑΒΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ :



Δ.Γλυκού 32, Βουλγαζα - Χαράδου,
Θεσσαλονίκη 542 49
Τηλ. 2310 311377 Fax: 2310 334378
www.ypsilon-agro.com

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:



Περιεχόμενο 500 κ. εκ. e

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Βλέπε φύλη

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το TORPEDO-II χρησιμοποιείται στην δοσολογία των 100κ.εκ. στα 100 λίτρα νερό.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με την πλήρη ποσότητα του νερού και αρχίστε την ανάδευση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Στην συνέχεια προσθέστε το TORPEDO-II. Συνεχίστε την ανάδευση καθώς γεμίζετε το ψεκαστικό δοχείο και κατά την διάρκεια του ψεκασμού.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Το TORPEDO-II συνιστάται για την βελτίωση της δράσης των ζιζανιοκτόνων της οικογένειας των σουλφουλουριών, των μυκητοκτόνων σιτηρών και των φυτορρυθμιστικών ουσιών.