Προφυλάξεις

● Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. ● Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. ● Μην αναπνέετε το σκεύασμα ή το ψεκαστικό υγρό. ● Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. ● Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή. ● Χρησιμοποιείτε κατάλληλη συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. ● Να μην χρησιμοποιείται παρουσία εγκύων γυναικών.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες), ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν προηγουμένως για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν με σκίσιμο, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΥΨΙΛΟΝ®

Πάσγουορντ

PASSWORD 25 EW

Μυκητοκτόνο

Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)

Tebuconazole (τεμπουκοναζόλη) 25 %

Εγγυημένη Σύνθεση : tebuconazole 25 % β/ο
Βοηθ. ουσίες: 73,95 % β/β

Αριθ. Εγκρ. Κυκλ: 60.111 / 10.04.07

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs, (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14.

Xn

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

- **Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.**
- **Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών.**
- **Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.**

N

Επικίνδυνο για το περιβάλλον

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

Τυποποιητής - Συσκευαστής: **Chemia Spa, Italy**
Παρασκευαστής - Διανομέας:

ΥΨΙΛΟΝ®

ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
Δ. Γληνού 32, Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com
www.ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο 500 κ.εκ.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Αμπέλι: Ωίδιο (Uncinula necator) 40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Εφαρμογές από το στάδιο της καρπόδεσης μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής.

Σπαράγγι: Σκωρίαση (Puccinia asparagi) 100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.

Όγκος ψεκαστικού υγρού:

Αμπέλι: 80-100 λίτρα/στρέμ.
Σπαράγγι: 100 λίτρα/στρέμ.

Μεγ. αρίθμ. εφαρμ. ανά καλλ. περ. / Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:

Αμπέλι: 2/12-14
Σπαράγγι: 3/14

Παρατηρήσεις:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Χρήση του PASSWORD 25 EW μόνο προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα κατά προτίμηση επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs (υποομάδα των τριαζολών) ή δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το tebuconazole.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά και αναδεύοντας προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Συνδυαστικότητα:
Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Αμπέλι: 21 ημέρες
Σπαράγγι: 6 μήνες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

208x104